

醫心方卷第十五

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

醫心方卷第十五

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

說癰疽所由第一 治癰疽^膿方第二 治癰疽有膿方第三

治癰發背方第四 治附骨疽方第五 治石癰方第六

治瘰癧方第七 治燥疽方第八 治久疽方第九

治緩疽方第十 治甲疽方第十一 治腸癰方第十二

治肺癰方第十三

說癰疽所由第一

劉涓子方云九江黃文問於岐伯曰余聞腸胃受穀

上焦出氣以溫分^九而養^九骨節通腠理中焦出氣如

露上注谿谷而滲^九孫脉津液和調變化而赤為血和

則孫脉先滿乃注絡脉^{三十}皆盈注乃於經脉陰陽已

張自息乃行有經紀周有道理與天合同不得休息

切而調之從虛法去實^{タシカミ}則不足疾則氣留去虛補

實則有餘血氣已調^九形神乃持今已知血氣之平與不

平未知癰疽之所從生成敗之時死生之期有遠近何

以度之可得聞乎

岐伯曰經脉留行不心與天同度與地合紀故天宿失度

日月薄蝕地經失紀水道涸竭^{一云天旱地乾}不成五穀不植經

實則有餘血氣已調形神乃持令已知血氣之平與不平未知癰之所從生成敗之時死生之期有遠近何以度之可得聞乎

岐伯曰經脈留行不心與不同度與地合經故天宿失度日月薄蝕地經失紀水道涸竭草木不植五穀不植經

路不通民不往來巷聚邑居別離異處血氣指然請言其故夫血脈營衛周流不休上應星宿下應經

數寒氣客於經絡之中則血凝滯不通則氣歸之不得復返故癰腫焉寒氣化為熱勝則穴

腐害則為膿不寫則爛勸爛則傷骨傷則髓消不當骨空不得泄寫剪枯空虛筋骨肌穴不相

親經脈敗漏內薰於五藏傷故死矣又云黃父曰夫子言癰疽何以別之岐伯答曰營

衛營留於脈文則血凝而不行則衛氣從之不通壅遏不得行大矣不心契熱

則寒腐為膿然不能陷肌膚枯於骨髓不為焦枯五藏不為傷也曰癰

黃父曰何謂疽岐伯曰熱氣淳盛當其下筋骨良害無餘故命曰疽上皮膚以堅上如牛

頭之皮癰者上薄以澤此其候也黃父曰乃如所說口癰疽姓名藏起處所色

訴狀候治与不治死活之期願事聞之

黃父日何謂疽岐伯曰熱氣淳盛當其下筋

骨良害無餘故命日疽上上皮交以堅上如牛

領之皮癰者上薄以澤此其候也

黃父日乃如所說口癰疽姓名發起處所色

訖秋後治与不治死治之期願事聞之

岐伯日癰疽黃白赤疽發額不寫十餘日死

其五日刺也其膿赤多血死未有膿可治人年

廿五卅一六十九十五百神皆在額不可見血者死也

禽疽發如斬者數十處西腫合穿板痛

其狀若掌十日可刺其內發身振寒起如

欲瘰如是十五死也

癰疽發項若兩耳下不寫十六日死其六日可刺其

色黑見膿而腐者死不可治人年廿十九廿三卅

五卅九五十一五十五六十一八十七九十神在兩耳不可

見血者死

針疽發兩肩此起有所惡惡結而內外營衛不

通發為針疽三日身腫痛甚口禁如瘰狀十日可刺不

治廿日死發背起心俞若肩隅廿日不寫死其八

日可刺其色赤黑膿見有死不治人年六十八

廿四卅五十六十七六十二九十八神皆在肩不可見血

者死

陰疽發髀若陰股始發腰強而不能自止數日

陰疽發髀若陰股始發腰強而不能自止數日

通發為金瘡三日身腫痛甚口禁如瘡狀十日不可死

治廿日死發背起心俞若肩隅廿日不寫死其八

日可刺其色赤黑膿見有死不治人年六十八

廿四廿五十六十七六十二九十八神皆在肩不可見血

者死中腹乳腋外陰疽發背若陰股始發腰強而不能自止數日

不能多五日堅痛如此不過三歲死

刺疽起肺俞若肝俞不寫廿日死其八日可刺發

而赤其上突如柶子者不可治人年一九廿五廿

三卅九五十七六十七三六十一九十七神皆在背不可見

血者死

脈疽發環頸一方如痛身隨而熱不欲動情

或不能食此有所大畏延遲不精上氣欬逆氣絕

其發引耳不可以動廿日可刺八十日死

龍疽發背起胃俞若腎俞廿日不寫死廿日可

刺其上赤下黑若青膿黑死發血膿者不死

首疽發熱八十日一方云八九日大熱汗頭引身盡如

癰身熱同如沸者擇皮頗腫處淺刺之不刺

入腹中廿日死

俠榮疽發脇若起兩肘頭廿五日不寫死其九日可

刺發赤白間其膿多白而無赤可治也人年一十六

廿六卅二卅八五十八六十四八十九六神皆在背不可見血

者死

癰身焚同。如津者擇皮頗腫處淺刺之不刺

入腹中七日死

俠榮疽發脇若起兩肘頭廿五日不傷死其九日可

刺發赤白間其膿多白而無赤可治也人年一十六

廿六廿二廿八五十八六十四八十九六神皆在臂不可見血

者死

行疽發如腫或復合相往來可要追其所在刺

之即愈勇疽發股起太陰若伏鼠廿五日不傷死

其十日可刺

勇疽發股清膿赤黑死白者尚可治人年十一十

五廿廿一廿三廿六五十九六十三七十五九十一神皆在尻

尾不可見血者死

標淋疽發熱同耳聾後六十日腫如裹水狀

如此可刺之但出水後及有血出即除也人年五

十七六十五七十三八十一九十七神皆在背不可見血

者死

癰疽發足趺若足下廿日不傷死其十二日可刺

癰疽發赤白膿不入大其其上白赤黑膿

死不可治不黑可治人年十三廿九卅五六十十七

十三九十三神皆在足不可見血者死

衝疽發少腹痛而振寒熱四日可刺五日痛六日

寢而可刺之不刺之五十日死

癰疽發赤白膿不入大肉其上白赤黑膿

死不可治不里可治入年十三十九廿五六十

十三九十三神皆在足不可見血者死

腸中清滿也

衝疽發少腹痛而振寒熱四日可刺五日痛六日

瘰而可刺之不刺之五十日死

敦疽發兩手五指頭若足五指頭十八日不罵死

其四日可刺其發日而黑難不甚未過節可治也

疥疽發腋下若臂兩掌中振寒熱而益乾者

飲多即飲煩心煩或六十日乾及有合者如此

可汗不汗入腹內死勸發背使脊兩邊

大筋其色蒼八日可刺也有癰肥腸中九

十日死

陳乾疽發兩臂三四日痛不可動五十日身熱

而赤六十日可刺之如刺肺無血三四日病已無膿

者死

蚤疽發手足五指頭之過節其色不變十日之內

可刺也過時不刺後為有癰在腋三歲死

丹疽發身腫牢板而身熱不可以坐不可以行不

可以在申成膿刺之即已除

白疽發脾若肘後癢目赤傷精乃身熱多汗

五六歲死心主有腫癰在股胫六日死發膿

而六十日死

丹疽發身腫牢板而身熱不可以坐不可以行不可以屈伸成膿刺之即已除

白疽發脾若肘後瘰癧目赤傷精乃身熱多汗五六處死心主有腫癰在股胫六日死發膿血六十日死

黑疽發腫居脊大骨上八日可刺也過時不刺為骨之疽膿出不可心碎骨六十日死

腸少陽有腫癰在頸八日死發血膿十日死創疽發身先瘰癧後痛此故傷寒氣入藏焉

發為創疽九日可刺不刺九十日死

尻腰大陽脉有腫交脉屬於陽明癰在頸十日死發膿血七十日死

尻大陽脉有腫癰在足心陽明少陽八日死發膿血八十日死頭陽明脉有腫癰在尻六日死發

膿血六十日死股大陽脉有腫癰在足大陽十七日死發膿血百日死

肩大陽大陰脉在腫癰在胫八日死發膿血四百日死

足少陽脉有腫癰在脇八日死發膿血六百日死

手陽明脉有腫癰在腕一歲死發膿血二歲死

黑疽發腋死黑疽發身中如米此大疽死

肩大陽大陰脉在腫癰在胠八日死菰膿血四百
日死

足少陽脉有腫癰在脇八日死菰膿血六百日死

手陽明脉有腫癰在臑一歲死菰膿血二歲死

黑疽菰臑死黑疽菰耳中如米此大疽死

黑疽菰肩不死可治黑疽菰缺盆中名曰伏癰死不治

黑疽菰脅可治黑疽菰肘上下不死可治

赤疽菰陰股堅死濡可治赤疽菰脾極六日可治不治出歲死

赤疽菰掌中可治髀解際指本黑頭赤死

赤疽菰陰死不治黑疽菰肥腸死

黑疽菰膝臑堅死濡可治黑疽菰扶上堅死

足下久癰色赤死不可治

又云夫癰疽者初菰始發多不為急此實奇患

患惟宜速療之、不苦速病成難救以此致

禍能不痛哉且述所懷、悟後賢謹條黃父癰

疽論、癰所著緩急之、死生之期如右別癰

之形色難易之療如左

菰皮突淺腫高而赤即消不療先愈

菰蘗突深腫下而堅其色或青黃白黑或復微

契而赤宜急療之成消中半

菰附骨者或未覺內、突、已殃、者癰疽之

甚也菰背外皮薄為癰皮堅為疽如此者多現

之形色難易之療如左

發皮突淺腫高而赤即消不療先愈

發筋突深腫下而堅其色或青黃白黑或復微

契而赤宜急療之成消中半

發附骨者或未覺內突已殃者癰疽之

甚也發背外皮薄為癰皮堅為疽如此者多現

先兆宜急療皮堅甚大者多致禍矣

太素經云黃帝曰願盡聞癰疽之形与忌日

名岐伯曰癰發於蓋中名曰猛疽不治化

為膿不寫塞咽半日死其化為膿者寫已

則含豕膏母冷食三日而已今案劉涓子方癰疽極者十八種云則是也

發於頸名曰父疽其癰大以赤黑不急治則契

氣下入刺掖前傷僮脉内薰肝肺十餘

日而死矣

陽氣大發消腦而項名曰腦鑠其色不樂項

痛而刺以針煩心者死不治

發於肩及膈名曰疵癰其狀赤黑急治之此合

人汗出至足不害五藏癰發四五逆喘之今案劉涓子方癰四五逆

喘之此七字無發於掖下赤堅名曰朱疽治之用砭石砍

細而長數砭之塗以豕膏六日已勿果表之

其癰堅而不潰者為馬刀使嬰急治之今案劉涓子方作鼠膏

發於胃名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治

下入腹不治七日死

人汗出至足不害五藏癰發四五逆燭之今葉金消子方癰四五逆

燭之此發於腋七字無下赤堅名曰朱疽治之用砭石方癰四五逆

細而長數砭之塗以豕膏六日已勿果表之方癰四五逆

其癰堅而不潰者為馬刀使嬰急治之今葉劉涓子方作鼠膏

發於胃名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治

下入腹不治七日死

發於脅名曰敗疵者女之病也灸之其病

大癰膿治之其中乃有生肉大如赤小豆剉方癰四五逆

翹草根各一升水一斗六升煮之竭為三升即

強飲厚衣坐釜上令汗出至足已方癰四五逆

發於股胛名曰脫疽其狀不甚變而癰膿搏骨

不急治卅日死

發於尻名曰兌疽其狀赤堅大急治之不治卅日

死矣發於股陰名曰赤施不急治六日死在兩

股之內不治六十日而死

發於膝名曰痲疽其狀大癰色不變寒熱而

堅勿石之之死須其柔乃石之者勿石之者准例皆砭之此准言石之或以冷石

刺之所以堅而不石以其寒聚結聽柔乃石已

諸癰疽之發於節而相應者不可治也

發於陽者百日死發於陰者卅日死也大夫陰者日陽婦人陰者日陰

發於胫名曰冤齧其狀赤至骨急治不治害人也

發於踝名曰走緩其狀色不變數石其輪而心其

寒下死石其輪者以冷石

刺之所以堅而不石以其
寒聚結聽榮乃石已

諸癰疽之發於節而相應者不可治也

發於陽者百日死發於陰者卅日死也

大夫陰者日陽
婦人陰者日陰

發於脰名曰冤鬻其狀赤至骨急治不治害人也

發於踝名曰走緩其狀色不變數石其輪而心其

寒不死

石其輪者以冷石
刺其所由之輪也

發於足上下名曰四淫其狀大癰不色變不治百

日死

足上下者是
跌上下也

發於足傍名曰厲疽其狀不大初如小指發急

治之去其里者不消輒益不治百日死

發於足指名曰脫疽其狀赤黑死不治不赤黑不死

治之不表急斬去之活不然則死矣

又云身有五部伏菟一

伏菟在膝上六寸起肉禁不可灸又不言
得尉此要禁為第一故生癰疽者死也

腓二腓者端也

腓音肥肱筋一名端脇一名直脇禁不可
刺故端為要害之處生癰疽者死也

背三

自晉月輪已上十一椎兩箱稱背去臆府甚
近死皮肉至薄若生癰疽陷而必死也

五藏之輪四

五藏手
足廿五輪

當於輪中生
癰疽者死也

項五

頭之前白頸後日項三陽督
脈在項故項生癰疽致死也

五部有癰疽者

死

癰疽害甚故
生人要處致死

又云楊上善曰癰生所由凡有四種也

喜怒無度爭氣聚生癰一也飲食不依節度縱

情不擇寒溫為癰二也藏陰氣虛府陽氣

實盛生癰三也邪容於血聚而不行生癰四也

癰疽一也癰之久者敗骨名疽也

又云夫積石成山積氣成癰不從天下不從地出

喜怒無度爭氣聚生癰一也飲食不依節度縱情不擇寒溫為癰二也藏陰氣虛府陽氣實^三盛生癰三也邪容於血聚而不行生癰四也

癰疽一也癰之久者敗骨名疽也又云夫積石成山積氣成癰不從天下不從地出皆由不去脆^青故也

病源論云癰者由六府不和所生也疽者五藏不調所生也

凡腫一寸至二寸癰也二寸至五寸癰也五寸至一尺癰疽也一尺至三尺者竟體腫成九孔皆出諸

氣憤鬱不遂志欲者血氣畜積多發此疾凡發腫高者^五疥源淺腫下者^五疥源深大熱者易

治小熱者難治

凡五月勿食不成^九板菓及桃棗葢癰疽瘰

凡入汗入諸食中食之則作丁劇癰瘰

凡銅器蓋食汗食之令葢惡創內疽

凡解與贈合猪肝肺食葢疽

凡醉強肥食不^五葢發疽

醫門方云凡癰腫發於背欲得高即腫浮淺

在外縱結膿者^五多老腫不高沉在內裏者其腫深膿潰向內必死

范汪方云經言五藏不調致疽六府不和生癰疽

凡醉強肥食不幸發疽

醫門方云凡癰腫發於背欲得高即腫浮淺
在外縱結膿者多老腫不高沉在內裏者其
腫深膿潰向內必死

范汪方云經言五藏不調致疽六府不和生癰疽

急者有十一日耐疽者急二三日致人緩者十餘

日二日癰疽急者十餘日致人緩者一月三日緩

疽急者一年致人緩者數年四日水疽所發多

在手足數年猶可治疽者有數十種要如此

癰之疾所發緩地不致人所發若在險地宜

令即消若至小膿猶可治至大膿者致禍矣

一為胞戶在玉枕下一寸二為古本三為懸癰四

為頸節五為胡脈六為五藏俞七為五繫八為

兩乳九為心鳩尾十為兩手臑際十一為腸屈之

間十二為小道之後十三為九孔十四為兩脇腋十

五為神主之舍凡卅五處不可傷而况於癰乎若

癰發此地遇良醫能令不及大膿者可救至

大膿者害及矣

癰疽脈洪脈難治脈微滿者易愈諸浮數之

脈當發熱而又惡寒癰也

癰起於節解過遇頑腎不能即消令至大膿者

豈膏藥可得生復

大膿者害及矣

癰疽脈洪^{皮膚淺也}難治。脈微滿者易愈。諸浮數之

脈。應當發熱。而又惡寒。癰也。

癰起於節。解過遇頑。腎不能即消。令至大膿者。

豈膏藥可得生復。

治癰疽未膿方第二

醫門方云。扁鵲曰。癰腫。癰疽。風腫。惡毒腫等。

當其頭上。灸之數千炷。無不老者。四畔之灸。三二

百炷。此是醫家秘法。小者灸五六處。大者灸七八處。

癰疽腫一二日未成膿。取伏龍肝下篩。醋和。

如泥塗爛布上。貼腫燥。即易無不消。冷藥著氏方和
鷄子中黃塗

劉涓子方云。癰疽之甚。未發之兆。飢渴為始。

茲之始。或發白。疽似若小瘡。或復大痛。皆是發。

候。宜善察之。欲知是非。重案其處。是便隱痛。復

案四邊。比方得失。審定之後。即灸第一便。灸其

上二三百炷。又灸四邊一二百炷。少者灸四邊中者灸

六處。大者灸八處。炷數處所不患多也。灸應即

帖即薄。令得即消。內服補腎湯。散不^湯已。服冷^湯薄。

外即冷薄。不^湯已。用^湯熱薄。帖之。法當開其口。

泄熱氣也。

治癰疽始作腫不赤而熱長甚速。非薄帖所

制。犀角槍湯方。

六處大者灸八處。壯數處所不患多也。灸應即
枯即薄。令得即消。內脈補。腹湯散不。已。脈冷。薄
外即冷薄。不。已。用。灸。薄。枯。之。法。當。開。其。口。
泄。熱。氣。也。

治癰疽始作腫不赤而熱長甚速非薄枯所
制犀角槍湯方

犀角三兩 大黃三兩 升麻三兩 黃芩三兩 女子
三兩 黃連三兩 甘草三兩

右七物切以水一斗二升煮取六升使極冷以故
練雨重入湯中槍腫處小煖易恒令濕一日
一夜數百過

治癰腫黃耆治癰腫瘰癧及欲發背覺痛方

黃耆一兩 黃芩一兩 芍藥一兩 當歸一兩 黃連一兩
白薇一兩 夕藥一兩 防風一兩

右八物搗下篩以雞子白和塗故布上以枯腫
上煖復易患熱者加白薇患痛者加當歸

各一兩

千金方云凡癰疽始發或似小瘡或復大痛或

復小痛或發米粒大白膿子此皆微候宜善察之

見有少異即須大驚忙急治之及新口味速服諸

湯下去熱毒若無聲藥即灸當頭百玉其大重

者灸四面及頭二三百壯數不必多也復薄冷藥

古重灸文藥必急也

千金方云凡癰疽始發或似小瘡或復大痛或

復小痛或發米粒大白膿子此皆微候宜善察之

見有少異即須大驚忙急治之及新口未速服諸

湯下去熱毒若無聲藥即灸當頭百玉其大重

者灸四面及頭二三百壯數不必多也復薄冷藥

貼種救癰必老速也三當頭以大針入四入即

老

凡諸異腫種不同者無問久近皆服五香湯刺

去血小豆薄之其間數以針刺去血若失治已潰

爛者猶服五香及漏蘆湯下之以外麻湯榆洗

之尉外麻膏若生息定者白蘆茹散付之青黑

宗去盡即傳之好肉生付外麻膏肌不生付一物

黃耆散若付白蘭茹青黑惡寒不盡者可以漆

頭蘭茹半錢和三錢白蘭茹散稍付

升麻湯外麻膏在治丹之方黃耆散商茹散在後疽之方

內消散凡是癰疽皆宜服之方

赤小豆一升熬內醉中人參二兩甘草二兩瞿麥二兩

白薇三兩當歸二兩黃芩二兩防風一兩

黃耆三兩薏苡仁三兩外麻四兩

十二味酒服方寸匕日三夜二長服取老今案廣濟方

汪方云內消散治膺腫不潰白芷十八白薇十八芎藭十八芍藥十八桂枝七合干薑七凡當歸七八茵草七八凡八物治合以酒服五

白薇三兩ヤチカア 當歸二兩オモリ 黃芩二兩ヒツキ 防風一兩ハツキ

黃耆三兩カハモケ 薏苡仁三兩ツシタ 外麻四兩トリヲアシクセ

十二味酒服方寸匕日三夜二長服取老今案廣濟方同之但范注

汪方云內消散治膺腫不潰白芷十八白薇十八芍一七八芍藥十八枳七合干薑七八當歸七八茵草七八凡八物治合以酒服五分日再又今李方內消散治癰腫不潰方用白芷十八芍藥十八當歸七八合世消十八芍一十八當歸七八干薑七八七物下莖酒服五分日二一方有白薇一八

治癰腫痛煩困方

生椒葉十重ナシ 括之以布帛裹緩勿令急日二易止

痛消腫食膿勝於衆括冬以先于者臨時塩湯モ

浚潤用之イ 葛氏方劉涓子方同之

廣濟方犀角丸治一切毒腫癰乳發背脹之止癰化

膿為水遂大小便出神効方ナシ

犀角十二分トリヲアシクセ 外麻一兩オモリ 大黃五分ヒツキ 黃芩五分ヒツキ 防風一ハツキ

兩オモリ 當歸一分カハモケ 黃耆カハモケ 交子人オモリ 乾薑ハツキ 黃連人カハモケ 參カハモケ

耳草各一兩オモリ 已豆廿三枚オモリ

凡十三物治下篩以蜜和凡如梧子大空腹以飲オモリ

脹十九取上三行快利常服為效オモリ 疥癩オモリ 疥癩オモリ 疥癩オモリ

猪肉オモリ 猪オモリ 肉オモリ 猪オモリ

効驗方治卒癰腫白薇括方

大黃三分オモリ 黃芩三分オモリ 夕藥二分オモリ 白薇三分オモリ 赤石オモリ

脂一分オモリ

凡五物治合下篩以鷄子白和如泥塗紙以薄オモリ

猪肉 猪食

効驗方治卒癰腫白簽^丸帖方

大黃三升 黃芩三升 夕藥二升 白簽三升 赤石
脂一升

凡五物治合下篩以鷄子白和如泥塗紙以薄

腫上燥易之

錄驗方治癰腫運赤痛及已潰松脂^丸帖方

成練松脂一斤 蠟蜜半斤 猪脂四斤 當歸

二兩 黃連一兩 黃蘗一兩

凡六物文咀三物盡合煎三沸三下候^安帖色

變^丸炭紫色者藥成絞去滓若初腫未有

膿者塗紙帖腫上日三易夜再若以潰

有口者穿紙出瘡口帖四邊令膿聚

不食傍客速老全棄諸方松脂^丸帖

已多但劉涓子方松脂二斤黃連一兩

附子兩 黃芩一兩 夕藥一兩 細辛一兩

石膏二兩也 又効驗方杏仁一兩 臘蜜一兩

松脂一兩厚朴一兩也

千瘡萬病霜膏治金木創癰疽諸惡創若

始得癰瘳腫上五百過即消若以潰者著瘡中

食膿去其具在本方小品方云經言寒氣客於

經絡之中則血氣凝滯不行壅結則為癰疽也

松脂一兩厚朴一兩也

千瘡萬病霜膏治金木創癰疽諸惡創若
始得癰摩腫上五百過即消若以潰者着瘡中
食膿去其具在本方小品方云經言寒氣客於
經絡之中則血氣凝滯不行壅結則為癰疽也
不言契之所作其成癰久寒化為契盛則實
腐爛為膿也依經証推之由人體中有契被
寒冷搏之血脉凝滯不行熱氣擁結則為癰疽
也是以治癰疽方有灸法者治其始中寒
未成契之時也其用灸薄估者治其契已成以消
契使不成膿也今人多不悟其始不用溫治及灸
法也今出要方以治其成形者耳赤色腫有尖頭者
根廣一寸以還名為癰其廣一寸以上者便為小癰
也其始粒大為疣

治作癰令消方

取鹿角就磨刀石上水摩之以汁塗烙復塗
則消也內宜脹連麴湯下

又方生春小豆下篩鷄子白和如泥塗之

治始作癰正赤契痛方

單燒鹿角作末苦酒和薄之乾復塗之自
消又方單搏大黃苦酒和薄之溫則易

治癰及癰始結腫赤契方

又方生春小豆下篩鷄子白和如泥塗之

治始作癰疔赤契痛方

單燒鹿角作末苦酒和薄之乾復塗之自消又方單搗大黃苦酒和薄之溫則易

治癰及癰始結腫赤契方

水摩半夏塗之然更塗得膿使消也

山草中自可掘取生半夏乃佳神驗

葛氏方治諸癰疽發背及乳房初起所赤急痛不早治斂入使速消方

但灸其上百壯

又方釜底土搗以鷄子中黃和塗之

又方搗蜂根薄之

又方搗黃蘗下篩以鷄子白和厚塗干復

易立愈

治癰發背腹陰處通身有數十方

取干牛矢燒搗細重絹篩下以鷄子白和塗

干復易秘方

范任方治癰腫初腫痛急方

以冷鐵熨溫輒易

又方取桑葉令心黑末作屑以鷄子白和之

以塗練上傳腫上小穿練上作小口以泄氣癰

毒便消當數易之此藥神秘方

今案葛氏方治諸癰疽發背

范任方治癰腫初腫痛急方

以冷鐵熨溫輒易

又方取桑葉モリ令心黑未作屑以鷄子白和之

以塗練上傳腫上小穿練上作小口以泄氣モリセ癰

毒便消當數易之此藥神秘方今案葛氏方治諸癰疽發背

及乳房初起所赤惡痛使速消

本草拾遺云水蛭人患赤白疰癰及癰腫毒腫取

十餘枚令宿病處取人皮數肉白無不老者冬月無

蛭汪中掘取暖湯令動先洗人皮臍以竹筒盛蛭繫

之須臾咬血滿自脫更用飢者今案經心方云以水蛭食去惡血

僧深治癰方

梁上麝燒葵末アモ八等苦酒和傳之燼復傳治

乳癰三愈

治癰疽有膿方第三

病源論云凡癰若按之都牢斬者未有膿也按

之半軟者有膿也又以手掩腫上不熱者無膿若

熱甚者為有膿凡覺有膿宜破之不尔侵食筋骨

劉涓子云癰大堅者未有膿半堅半薄半有膿

當上薄者都有膿便可破之法應在下注上

破之令膿易出用針針膿深難見上密厚而生肉

大針若外不別有膿可當其上數案之內便隱痛

者案案堅者未有膿也案更不痛於前者肉膿已

勢甚者為有膿。凡覺有膿，宜破之。不尔，侵食筋骨。

劉涓子云：癰大堅者，未有膿；半堅半薄者，有膿。

當上薄者，都有膿，便可破之。之法，應在下。上

破之，令膿易出。用針針膿深，難見上，害厚而生肉。

大針若外，不別有膿，可當其上數案之內，便隱痛。

者，實殃。堅者，未有膿也。案更不痛於前者，內膿已

熟也。膿泄去，熱氣不尔，長連，則不良。

癰審知有膿者，案之，處陷不復者，無膿。案之即復

者，有膿。初腫大，案乃痛者，病深。小案便痛者，病淺也。

凡破癰之後，病人便綿惓，欲死，便內寒。熱腫自有似

癰而非者，當以手按腫上，無所連，是風毒耳。勿針，可

脹外麻，湯外麻膏破癰口，當令下流。三、五、近下一、

令針極熱，便不痛。

夫癰壞後有惡寒者，當以猪蹄湯洗去其穢，次傳食。

肉膏散惡寒，盡乃傳生肉膏散，乃摩四邊，令善寒。

速生，當絕房室，慎風冷，勿自勞動，須筋脈復常，乃

可自勞耳。不尔，新寒易傷，則重發，慎之。

治癰疽洗瘡猪蹄湯方

猪蹄一具，黃連五兩，芎藭三兩，當歸三兩，甘草

三兩，夕藥三兩，墻蘖一斤。又方：代大黃三兩。

右七物以水二斗煮，蹄取一斗，內諸藥，復煮取四斗。

洗之。

治癰疽食惡寒蘆茹散方

治癰疽洗瘡猪蹄湯方

猪蹄一具黃連五兩シムナクハ芎藭三兩當歸三兩甘草

三兩又方代大夕藥三兩又方代大壩薇一斤又方代大

右七物以水二斗煮蹄取一斗內諸藥復煮取四斗

洗之

治癰疽食惡寒蘆茹散方

蘆茹一兩洗頭樊石二斤雄黃二斤流黃二斤今案錄驗方雄黃一兩

右四物下篩著先頭內創口

今案錄驗方雄黃一兩
樊石一兩蘆茹一兩也

治癰疽發背已潰未潰生寒排膿散方

當歸二兩桂心二兩人參二兩芎藭一兩厚朴一兩

防風一兩甘草一兩白芷一兩桔梗一兩

石九物楊下篩溫酒服方寸匕日三夜再創未合可

長服之

全案僧深方治癰腫身潰長寒排膿蜀椒散方蜀
椒桂心甘草干薑芎藭當歸各一兩凡六物服法如上又
方治癰腫排膿散方黃耆四兩夕藥二斤日服二斤
芎藭二斤赤小豆一八凡五治下服如上

治癰疽食惡寒膏方

松脂五兩雄黃二兩雌黃二兩治葛皮一兩洗頭

蘆茹三兩巴豆百枚猪膏一斤

右七物煎松脂消下諸藥炭火上煎三上三下

膏成絞去滓著先頭內創中日六七食惡寒初

用病當更腫赤但用如節度惡寒盡心勿使

過也

治癰疽發背已潰生寒膏方

甘草二兩當歸二兩白芷二兩烏朮六枚今案縱

右七物煎松脂消下諸藥炭火上煎三上三下
膏成絞去滓著^{カミヤ}兔頭內劇中日六七食惡^カ寒初
用病當更腫赤但用如節度惡寒盡心勿使
過也

治癰疽發背已潰生^ク完膏方

甘草二兩 當歸二兩 白芷二兩 烏^{オウ}朮六枚 寒^カ縱
容二兩 蜀^{シヨク}椒二兩 蛇^{ヘビ}銜一兩 細辛二兩 薤^{シラカサキ}白二兩 干地
黃二兩

右十物切以好酒半升和漬^ル再宿以不中水^ル猪
肪三斤煎一沸下^チ餘心復三上三下膏成^ク急

手^{シホ}絞之 今案錄驗方治癰疽生完膏方 苧草二兩生地
黃五兩當歸二兩續斷一兩黃芩二兩白芷三兩甘
草二兩薤白二兩猪膏一升大黃四兩
凡十物吹咀薤三上三下膏成傳之

治癰疽^{シホ}變爛洗大黃湯方

大黃二兩 黃芩^{ヒツキ}一兩 白^{ヤチカミ}芷一兩

右三物合搗下篩以水一升二合煮一沸絞去滓
適^{トク}冷^マ暖以洗瘡日十過

范汪方治癰創^{シホ}熱已退膿血不^レ心瘡中空^ク虛

疼痛排膿內塞^{シホ}煎方

散方

此散方藥三種
尚論云又五字誤
欽定四庫全書
防風^{フウフ}一兩 伏苓^{フツセイ}一兩 白芷一兩 桔梗一兩 遠志

一兩 甘草一兩 桂心二兩 人參一兩 芍藥一兩
當歸一兩 附子二枚 炮^{イリ}厚朴二兩 龍骨一兩

疼痛排膿內塞散方

散方

此散方藥三種
尚論又入五字誤
故可也校入本書

防風一兩（イロコト） 伏苓一兩（イロコト） 白芷一兩 桔梗一兩 遠志

一兩 甘草一兩 桂心二兩 人參一兩 芍藥一兩

當歸一兩 附子二枚（炮イロ） 厚朴二兩 龍骨一兩

赤小豆五合（熬イロ） 凡十五物治下節溫酒服

方寸匕日三夜一

此散方藥三種
尚論又入五字誤
故可也校入本書
千金方同之有
下發背余

集驗方治癰瘡膿血不心瘡中空虛疼痛排膿

內補散方

防風一兩 遠志一兩 當歸二兩 黃耆一兩 白芷

一兩 甘草一兩 桔梗一兩 通草一兩 厚朴二兩

人參一兩 桂心一兩 附子一兩（オウ） 赤小豆五合（熬イロ）

凡十五物治合節未食溫酒服方寸匕日三夜

伏苓一兩
今案廣濟
方同之

令李方治癰內補排膿散方

黃耆二兩 當歸二兩 赤小豆廿枚 芍藥一兩

夕藥二兩 大黃一兩

凡六物治合下節以粥清服方寸匕日三

又去治癰腫桂心散方

黃耆六兩 夕藥四兩 桂心一兩

凡三物治下節酒服方寸匕日三

錄驗方洗癰疽并惡創毒氣猪蹄湯方

又云治癰腫挂心散方

黃耆六分 芍藥四分 桂心一分

凡三物治下莖酒脹方寸匕日三

錄驗方洗癰疽并惡創毒氣猪蹄湯方

當歸四兩 甘草四兩 芍藥五兩 芎藭二兩

白芷四兩 茵草二兩 黃芩四兩 狼牙四兩猪一具

薤白根一兩 大黃四兩

凡十一物先以水二升半別煮猪蹄取一升半去

蹄內諸藥煮得再沸下來灰汁一升又煮取

一升半湯成稍以洗創瘡結疽初腫時去狼

牙內灰汁瘡既潰用狼牙除灰汁

僧深方治癰疽瘡臭爛洗瘡青木香湯方青

青木香一兩 芍藥一兩 白殿一兩 芎藭一兩

凡四物水四升煮取二升去滓溫洗瘡日三

明日以膏內瘡中日三

醫門方瘡癰腫已膿懼針令膿自出方

右取鹿角刮取細末和醋聚安腫上經宿

膿自出若膿深者先爵生栗薄之撮膿向

上極妙

瘰癧腫不消已有膿不能針自令穿潰方

空腹脹葵子一枚一宿即穿出膿神妙

右取廐角刮取細末和醋聚安腫上經宿膿自出若膿深者先爵生栗薄之撮膿向

上極妙

療癰腫不消已有膿不能針自令穿潰方

空腹脹葵子一枚アヒシヲア宿即穿ア出膿神妙ラシル

葛氏方治癰已有膿當使速潰壞方

雀矢以苦酒シ和塗上如小豆又方吞薏苡子苡我

勿多

新脩本草云癰膿使速潰方

吞藹實一枚破癰腫藹アヒヒ

蘇敬本草注云吞惡實一枚出癰疽頭キヤキハ一カキヤキ方

千金方治癰潰後瘡不合方

燒鬣皮一枚作灰封孔中又方塗牛干易ツルキカクモ

又方燒破蒲席灰和猪脂內孔中

救急單驗方療頭癰曰即骨陷方アチ 或本元

先燒杏仁令黑磨陰液取棗木紫葛蔓方及外 王カウ

乾真燒灰和薑黃臈月猪脂塗神驗

治癰發背方第四

病源論云癰發背者多發於諸府俞也六府不和

則生癰諸府俞皆在背其血氣結絡於身六府氣

不和湊理虛者經絡為寒所客析於血則壅不通

故結成癰發其俞也熱氣加於血則肉血燄化而為

治癰發背方第四

病源論云癰發背者多發於諸府俞也六府不和
則生癰諸府俞皆在背其血氣結絡於身六府氣
不和湊理虛者經絡為寒所客折於血則壅不通
故結成癰發其俞也熱氣加於血則肉血熱化而為
膿癰初結之狀腫而皮薄以澤背上忽有赤腫而
頭白搖之連根入應胃裏動是癰也發背若熱手
不可得近者內先服王不留行散外摩發背膏
大黃帖若在背生破無苦良不得膿以食肉膏散
者兗頭內癰口中人體熱氣歇服本散五日後
癰欲老者服排膿內塞散之

千金方云諸日凡發背由脹五石寒食更生散所
致亦有單脹鍾乳而發者又有生平不服石而
自發者此是上世有脹之者

其候寧多於背兩中間起初如粟米大或痒仍
作赤色人皆初不以為事日漸長大不過十日遂

至不救其臨困時方圓經三四寸瘡有數十孔以
手案之諸孔之中膿皆乃出尋即失音不言

所以養生者小覺背上痛痒有異即取淨水和水
作泥捻作餅子經一寸半厚二以煎艾作炷灸上灸

之一炷易餅子若粟米大時可灸七餅即差若如榆
莢大灸七炷即差若至錢許大日夜灸不住乃差

至不救其臨困時方圓紐三四寸瘡有數十孔以
手案之諸孔之中膿皆乃出尋即失音不言

所以養生者小覺背上痛痒有異即取陣去水和
作泥捻作餅子經一寸半厚二分以麻艾作炷灸上灸

之一炷易餅子若粟米大時可灸七餅即差若如榆
葉大灸七炷即差若至錢許大日夜灸不住乃差

并服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈
又恒冷水射之潰冷石熨之日夜勿止待差住手

此病忌麵酒寒五辛等
凡腫起於背脊中頭白如乘粟四邊相連腫赤

黑令人悶乱者名發背不灸治即入內灸當針劇
上七八百壯

又方飲鐵漿漿下利為度又方鹿角灰酢和
塗之

排膿內塞散主大瘡熱已退膿血不心瘡中寒虛
瘡痛方

防風一兩 伏苓一兩 白芷一兩 桔梗一兩 遠志一兩
甘草一兩 桂心二分 人參一兩 芍藥一兩 當歸一兩

附子二枚 厚朴二兩 黃耆一兩 赤小豆五合
十五味為散酒服方寸二日三夜一則藥勢不宣

廣洛方療腫乳及五石等葭背毒熱方
黃芩三兩 白鴨屎五合 白蔞一握 香豉五合

切水六升煮取二升分溫三服

甘草一兩 桂心二分 人參一兩 芍藥一兩 當歸一兩
附子二枚 厚朴二兩 黃耆一兩 赤小豆五合 葵

十五味為散 酒服 方寸二 日三夜一 則藥勢不宣

廣洛方療腫乳及五石等莖背毒熱方

黃芩三兩 白鴨屎五合 白蔞一握 香豉五合
切水六升 煮取二升 分溫三服

經心方療發背方

以冷石熨腫上 驗 又方馬糞付于易之婦人
發乳之老

范注方治發背及諸癰腫已潰未潰方

搏豉小和水令如強泥作餅餅可腫大厚三指若
有創孔空遺之勿覆令汁出得以艾羅灸豉
豉上使溫之氣下徹豉欲煇若熱則易合

大熱剝爛皮也癰痛尋當轉滅便得安為灸
或有一日二日三日創孔中當汁出

治癰腫王不流行散方

王不流行二升 甘草五兩 治葛二兩 桂心四兩
當歸四兩 凡五物治合下獲以酒服方寸二 三夜一

葛氏方治癰莖背腫陰處通身有數十方

取干牛一矢燒搗細重絹篩下以鷄子白和
以塗之干復易秘方劉涓子方同之

又方用鹿角桂心鷄矢當別燒合之搗以

鷄子白和塗之秘方

當歸四兩 凡五物治谷下獲以酒服方寸匕三夜一

葛氏方治癰發背膿陰瘻處通身有數十方

取干牛一矢燒搗細重絹篩下以鷄子白和

以塗之干復易秘方劉涓子方同之

又方用鹿角桂心鷄矢當別燒合之搗以

鷄子白和塗之秘方

又方生栝樓根細搗以苦酒和塗上千復

易之 又方赤小豆塗之良

劉涓子治癰發背發房初起赤方

其上赤處灸百炷

又方搗紵根少水解以薄上

又方竈黃土鷄子白和塗上

又方樹上不落桃子未以好苦酒和傅上良

又云欲使速潰方水研半夏鷄子白和塗之能令

消

治附骨疽方第五

病源論云附骨疽者由體熱當風入骨解風与

熱相搏復遇涼濕或秋夏露卧為冷濕所折風

熱伏結壅遏附骨成疽喜大節解間丈夫及

產婦女人喜著髀膝額頭膝間嬰孩嫩兒

著髀肘背也其大老子著急者則先覺痛不得

轉動按之應骨痛經日使覺皮肉發急洪如脹

大則是其小兒不知字名之或近其身更帝

熱相搏復遇涼濕或秋夏露卧為冷濕所折風

熱伏結壅遏附骨成疽是附骨之疽也毒大節解間大夫及

產婦女人喜者鬚臛額頭眩膝間嬰孩嬰孩歔兒歔兒

著髀肘背也其大老子著急者則先覺痛不得

轉動按之應骨痛經日使覺皮肉發急洪如脹

次則是也其小兒不知字名抱之裁近其身便啼

愛則是友節有痛處便是其候也大老子著緩

者則先覺如肥洪耳經日便覺痺痛不隨也其

小兒則覺四支偏有不動搖者如不隨狀著之

節解中則有肥洪處其若不和是附骨疽乃

至令身成膿不潰至死皆舉體變青黯也其

其大老子有不別是附骨疽乎急者為賊

風其緩者謂為風腫而已皆不悟是疽乃至於

死

小品方云附骨疽一名滄疽以其無頭附骨成

膿故也又名癰疽以其廣大竟體有膿故也

附骨急疽與賊風實相似也其附骨疽者由

人體盛有熱之當風冷入骨解中風與熱

相搏其始候為欲眠沉重忽耳急者熱多

風少緩者風多熱少也賊風者其人體平無熱

中暴風冷則骨解深痛附骨疽久者則腫見

結膿賊風久則枯痛或結癰瘰以此為異也是附

人體盛有熱之當風冷入骨解中風與熱

相搏其始候為欲眠沉重抱耳急者熱多

風少緩者風多熱少也賊風者其人體平無熱

中暴風冷則骨解深痛附骨疽久者則腫見

結膿賊風久則枯痛或結癰瘰以此為異也是附

骨疽而作賊風治則益其病深膿多也是賊風

而作附骨疽治則加其冷風增遂成癰瘰偏枯

瘰癧之疾也

附骨急疽者其痛處必熱體中下寒下熱痰

惡寒不用熱小便或赤大便或難無汗也即

得治下去熱便得消也縱不消盡亦得浮

淺近外易壞潰其不復附骨也賊風之證但

痛應骨不可按按痛處不忙熱體不下寒

乍熱但覺體癢以冷飲得熱熨痛處即小

寬時有汗也即得針灸熨脹治風溫藥便

効也初得附骨疽即脹滿蘆湯下之傳小豆

薄得消也下利已虛而腫處未消者可除

大黃用生地黄及干地黄也熱漸退餘風未歇

者可服五香連翹湯除大黃也餘熱未消可傳

升麻膏佳若失時不消成膿者用大針膏散

如治癰法今案漏蘆湯升麻膏在第十七卷治之方五香連翹湯在第十六卷治惡核腫方皆出小品方

千金方云假附骨與賊風為異者附骨之始未腫

大黃用生地黄及干地黄也。熱漸退餘風未歇

者可服五香連翹湯除大黃也。餘熱未消可傳

升麻膏佳。若失時不消成膿者用大針膏散

如治癰法也。今案漏蘆湯升麻膏在第十七卷治之方五香連翹湯在第十六卷治惡核腫方皆出小品方

千金方云假附骨與賊風為異者附骨之始未腫

但痛而已其賊風之痛不熱附骨則其上必熱

凡初得附骨疽即須急脹漏蘆湯下之付小豆

散得消可服五香連翹湯

治骨疽方

又方未蕪菁子付帛裹一日一易

葛氏方治久疽骨疽以積年一合一葭汁出不老

方大焯飴以灌瘡中日三

又方以白楊葉屑傳之

治石癰方第六

病源論云石癰者只是寒氣客於肌肉析於氣血

結聚而成其腫結確實至牢有根核皮核相親

不甚熱微痛熱時自歇此寒多熱少漸如石故謂

之石癰也。又熱氣乘之乃有膿

小品方云有石癰者始微堅皮脈相親著不赤

頭不甚尖微熱漸自歇便極堅如石故謂石

癰難消又不自斂皆可百日中也

初作便脹防已連翹湯白針氣寫之傳續石

不思其... 瘰癧也。久、熱氣乘之。乃有膿。

小品方云有石瘰者始歲堅皮脈相親著不赤

頭不甚尖。歲熱、漸自敗便極堅如石故謂石

瘰難消又不自斃、皆可百日中也。

初作便脹防已連翹湯白針氣寫之傳導石

薄積日可消若失時不得治不可消已有膿者

只用此薄則連潰膿淺易為火針諸瘰潰

後用膏散依治瘰疽法初作即以小豆薄塗

之、消也

治瘰結腫堅如石或如大板色不變或作石瘰不

消者方

鹿角八兩燒作炭白蔞二兩鹿理黃色可作磨

石行一斤燒石極令赤內五升苦酒中復燒

竟復更內苦酒中令減半止搗石作末并

鹿角屑白蔞屑餘苦酒和如泥厚塗瘰上

裁乾更塗取消也

千金方治石瘰堅如石不作膿者方

生章陸根付之煨則易又治漏瘰

又方酢和菰蒼子末付根之得

凡發腫至堅而有根者日石瘰

又方當上灸百壯石子當出

又方梁上塵葵莖灰等酢和塗

千金方治石癰堅如石不作膿者方

生章陸根イ草搗付之オホミル煅則易又治漏癰腎門方

又方酢和オホミル菰蒼子末先付根毛之得

凡發腫至堅而有根者日石癰

又方當上炙百壯石子當出

又方梁上塵葵莖灰アモ等酢和塗

又方蜀來根一箇名白皮陰子少搗末五消膠以酒和来

皮付上付上即拔出

治癰癰方第七

病源論云癰癰者由風濕冷氣搏ト於血結聚所成

也腫結如梅李也

養生方云人汗入諸食中食之作癰癰

又云五月勿食不成核菓及桃棗發癰之

大素經云汗出見濕ル乃生癰疽セ注云癰癰之類然小

也俗謂之癰子カク

小品方治癰及癰始結腫赤熱者

水麻半オウ夏塗之三煅更塗得膿ム便消也山草

中自可掘取生半復乃佳神驗

千金方治癰子方

凡癰無頭者アモ吞葵子一枚多服他頭多又方牛黃ウ對之

徐伯方治癰癰方

搗商陸根イ草和糟薄之

又方搗百合根薄之食之ナリ得並

中自可抵取生半復乃佳神驗

千金方治癰子方

凡癰無頭者吞葵子一枚多服他頭多又方牛黃對之ツギ

徐伯方治癰癰方

鴉商イモ陸根イモ和糟薄之

又方鴉百合根薄之食之ナリ得並

又方鴉苦苣菜薄上又生倉食苦苣ナリ

徐伯方云鴉商陸根和糟薄之又方鴉生牛膝根ナリ薄之

范汪方云癰癰初生即灸其頭數百壯即愈

又云癰癰初生尚嫩者取如鷄子所石若凡十餘枚

燒以布帛裹熨之重安令極熱イモ炭者輒易二

三十枚則消

刑繁論云治癰癰方

鴉生シ紵根以薄腫上乃止

救急單驗方療初患似莖後破無痂カセ疼痛不可

忍名シ睹シ啄瘡方燒睹鼻作灰附附五老

陶景本草汪伏龍肝鴉商カセ合葫塗甚効

劉涓子方治癰癰虛腫方

當歸二兩 苜草二兩 赤石脂二兩 升麻四兩

白殿四兩 薤白シ四兩 大薤シ四兩 干玄參三兩

右八物下篩鷄子白和如塗故布上隨腫所大

小作シ貼之シ參復易之

陶景本草注伏龍肝鳩節合葫塗甚効

劉涓子方治癰癰虛腫方

當歸二兩 茵草二兩 赤石脂二兩 升麻四兩

白殿四兩 薤白四兩 大薤四兩 干玄參三兩

右八物下篩鷄子白和如泥故布上隨腫所大

小作枯之燥復易之

治燥疽方第八

病源論云燥疽之狀肉生小豎點小者如粟大者

如梅李或赤或黑下青下白有實核慘痛應心

或著身體其著手指者以代指人不別者呼為

代指不急治毒逐脉上入藏則致人南方得此疾

皆斬去指恐其毒上攻藏故也

又云十指端忽生榮痛入心不可忍向明望之見

黃赤或黯青黑是燥疽直斬後節十有一垂

又云風癰痛不可忍者燥疽也

疽發五藏愈節解相應通洞燥疽也諸是燥

疽皆死又齒間臭熱面不心燥疽也七日死治所

所不差以灰掩覆其面不示著人

又云諸是燥疽皆惟痛取利十有一活耳此皆寒

毒之氣容於經絡氣血不品毒變所生

小品方云癰疽者肉中忽生一豎子如豆粒小者如米

粒粟劇者如梅李大或赤或黑或青或白其豎狀

實瘰有根而不孚重也痛者瘰也其根深者

所不著以灰掩覆其面不示著人

又云諸是燥疽皆惟痛取利十有一活耳此皆寒毒之氣容於經絡氣血不流毒變所生

小品方云臁疽者肉中忽生一豔子如豆粒小者如米

粒粟刺者如梅李大或赤或黑或青或白其豔狀

實脉有根而不浮腫也痛瘰癧心其根極深達

肉肌也小久不治便四面悉腫瘰癧紫黑色能爛

壞筋骨也毒流散逐脉走入藏府則致人南方

人名為擒著毒得著厚肉處皆即割去之其燒臍

令赤燥瘡上令焦如炭之灸豔瘡上百壯為佳

軍春酸蔓菜薄其四面以防其長也飲葵根

汁藍青汁犀角汁外麻汁竹瀝汁黃龍湯諸軍

治能折其熱耳內外治法依治丹毒方也

臁疽著指頭者其先作豔疽然後腫赤黑豔瘡

痛入心是也代指者其先腫候其變痛色不豔也

已上千金方同之

千金方云燥疽秘方世不傳神良無比方

夜于二兩甘草二兩大黃十八麝香二八干地黄

二兩枳實二兩犀角六分前胡三

八味水九升煮取三升分服老止不限劑

治燥疽著手足肩背累如米起也白刮之汁出愈

復發方

發方

夜于二兩 甘草二兩 大黃十八 麝香二兩 干地黄

二兩 枳實二兩 犀角六分 前胡三分

八味水九升 煮取三升 分服 老幼不限劑

治燥疽暑手足肩背累如米起也白刮之汁出愈

復發方

發方

黃耆六分 款冬花二分 升麻四分 赤小豆一分

附子一分 黃耆一分

六味下篩酒服半錢上漸增至一錢日三

又方煑蕪菁子熟搗帛裹展轉其上勿止

又方煑麻子末摩上日五

又方卿夷長者乱髮如鷄子大猪脂二升煎塗

之

錄驗方治燥疽方

燒鐵令赤燥之 又方蛭啗九佳

又方飲葵根汁 又方飲藍青汁

又方飲犀角汁 又方飲黃龍湯

龍門方治癰疽徹骨痛方

取狗糞イヌ當戶根前燒作灰塗之燒時勿令患

人知驗

治久疽方第九

病源論云凡疽發諸節解及府藏之俞則卒急也其

龍門方治癰疽徹骨痛方

取狗^{イヌ}糞當戶根前燒作灰塗之燒時勿令患

人知驗

治久疽方第九

病源論云凡疽發諸節解及府藏之俞則卒急也其

久疽者發身解開處故經久積年致膿汁不盡則創

内生虫而變成癰

范注方治久疽衆醫所不能治方

沸^{モカ}醢灌^{ソメ}創中三晷即愈 葛氏方同之

治久疽惡創連年不老方

黃連^{カクマシ}二分 赤小豆^{アカアヅキ}二分 附子^{ブシ}半斤炮

凡三物^各搗為屑^{ナシ}合藥之若創有汁以屑^{ウタマヒ}傳之無

汁皆以猪膏和屑銅器中大上使一沸以傳之

千金方治久疽方

取^ヲ鴈^フ臠破其腹勿損腸^フ臍^ヲ內上白^ヲ塩^ヲ末以針縫合

於銅器中大煎令干末著創中無膿者以猪脂和

付小^{ヒコ}疼痛勿恠也

今李方治久癰疽漏多藥散方

夕藥^{マヒ}三分 大黃^{ヤブ}三分 白^{ハク}飯^イ三^カ分 莽草^{マウソウ}二分

凡四物治合下^イ獲和調之以酒服半^{ハク}錢上日二不

知^イ可^ヤ稍增至方寸^{ハク}二

治緩疽方第十

商原論云緩疽者由寒氣客於皮至骨也榮氣

今李方治久癰疽漏多藥散方

夕藥三八

大黃三八

白飯三八

莽草二八

凡四物治合下獲和調之以酒服半錢上日二不

知可稍增至方寸匕

治緩疽方第十

病源論云緩疽者由寒氣客於經絡致榮衛滯氣

血壅結所成其寒氣盛者則腫結痛深而回無頭

尾大者如拳小者如桃李永與皮肉相親著熱氣少

尾大者如肉俱爛如牛頰創漸至通體青黯不作頭穿

潰膿者是也以其結膿積久而其肉腐壞遲故名緩疽

名肉色疽也

小品方治緩疽方

初作宜脹五香連翹湯針去去西以小豆薄塗之其間

數以鏡針去西又薄之取消良也不消色未變

青黯者以鍊石薄之若失時不得消已爛者猶

服五香連翹湯及漏蘆湯下之隨熱多少投方

也外以升麻湯滄洗之傳升麻膏若生鼻惡肉者

可以單行一物白蔞茹散傳之青黑肉去盡便傳也

好肉生但傳升麻膏良矣不生傳單行一物

黃耆散也若傳白蔞茹散積日青黑惡肉不盡者

可以凍頭赤皮蔞茹散取半錢上和雜三大錢上白

蔞茹散中合治之稍以傳之惡肉去盡還淳用白蔞

可以單行一物白蔞茹散傳之青黑肉去盡便傳也
好肉カク熟生但傳外麻膏良矣不生傳單行一物
黃耆散也若傳白蔞茹散積日青黑惡肉不盡者
可以凍頭赤皮蔞茹散取半錢上和雜カチ三大錢上白
蔞茹散中合治之稍以傳之惡肉去盡還淳用白蔞
茹散也視好肉欲生可傳黃耆散也

白蔞茹散 凍頭蔞茹散 黃耆散

右三方並一物單行隨多少春下篩用耳

治甲疽方第十一

病源論云甲疽之狀創皮厚甲錯剥起是也其創
血膿恒欲搔カ爪之汁出其初皆是風邪折血所生而
創裏之有虫也

醫門方療甲疽其候甲際生怒肉痛不得著鞋
膿血不心方

右取石膽火上燒令烟盡研末傳瘡上消痛
不過三五度必老極効宜保愛之

隨時方治甲疽方目割甲傷肌作瘡瘻浸淫相染
膿血如火燒瘡日夜漸引名醫不能療者此方必老
如神

綠礬狀似朴消綠色炭燒沸盡候者色赤停

於筒取好者搗篩為散廉石不堪弃之勿用

右若患前件瘡者先以塩湯淨洗以綠礬散厚

膿血如火燒瘡日夜漸引名醫不能療者此方必奏如神

綠欖狀似朴消綠色炭燒沸盡候者色赤停

冷筒取好者搗篩為散廉石不堪棄之勿用

右若患前件瘡者先以鹽湯淨洗以綠欖散厚

傳之用帛纏裹經一日膿膿水即干若覺瘡干

急痛即塗藥取潤每一兩日一洗厚傳之病

初患瘡尚小膿小未多之時只取少許散藥

和藥如軟麵通用傳一兩日即老樣要方同之

治腸癰方第十二

病源論云腸癰者寒溫不適喜怒无度所致即氣与

榮衛相干在腹內遇熱加之血氣蘊積結聚成癰

熱積不散血內腐壞化而為膿其病之狀少腹痠

強小便似淋惡寒身皮甲錯膿皮急如腫狀甚者

腹脹大轉側聞水聲或繞脊生創而穿膿出又

大便膿血似赤白下而實非者是腸癰而不曉治

之錯者則致人

千金方腸癰之為病小腹重而極強之則痛小便數

似淋時汗出復惡寒其身皮甲錯腹皮急如腫狀

又云繞脊有創如粟皮熱使膿血似赤白下必死

治之方

屈兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血即愈

之歸者則致人

千金方腸癰之為病小腹重而抃強之則痛小便數

似淋時汗出復惡寒其身皮中錯腹皮急如腫狀

又云饒香有創如粟皮熱使膿血似赤白下必死

治之方

屈兩時^{カミ}正灸^{シク}肘頭^{トカシ}銳骨^{トカシ}谷百壯則下膿血即愈

又方大黃四兩 牡丹皮三兩 桃人五十枚 冬依人^{カモリ}一升

道消二兩 五朱水六升 煮取一升 盡服當下膿血

集驗方治腸癰湯方

薏苡^{ツタケ}人^{ツタケ}一升 牡丹皮三兩 桃人三兩 冬依人^{カモリ}一升

凡四物以水六升 煮取二升 久再服

范汪方治腸癰方

大黃一斤 金色者 大棗十六枚

凡二物以水一斗 煮取三升 宿勿食 能一服須臾

攻痛如火燒之 癰壞而即隨大便出

醫門方療腸癰方

甘依子^{ウツミ}一升 牡丹皮^{ウツミ}大黃^{別浸}道消^{カモリ}各三兩

桃人^{カモリ}甘草^{カモリ}水七升 煮取二升半 下大黃

更煮二三沸 絞玄滓內芒消入溫三服 當

下膿血

治肺癰方第十三

病源論云肺癰者由風寒傷於肺其氣結聚所成

也肺癰之狀其效^{シハフ}胸膈^{シハフ}肉滿隱^{シハフ}痛而戰寒又肺癰

桃人玄天甘草二兩水七升煮取二升半下大黃

更煮二三沸絞去滓內芒消八溫三服當

下膿血

治肺癰方第十三

病源論云肺癰者由風寒傷於肺其氣結聚所成

也肺癰之狀其效シハク胸內滿悶シ痛而戰寒又肺癰

有膿而溢者不須治其溢也膿止自愈

又云咽干口內燥而不渴時出濁唾腥臭久必膿

如粳米粥者難治

又云癰膿吐如粥始萌可救膿成則死

又云肺癰者在胃間效有血也

千金方云欬胸中滿而偏振寒脉數咽乾而不渴

時濁唾腥臭久必膿如粳米粥是為肺癰枯

梗湯主之

桔梗三枚甘草一兩

凡二物咬咀以水三升煮取一升トス校去滓過寒溫

久為再服朝飲暮吐膿血即愈葛氏方同之

范汪方治肺癰方用

薤白一升ニキクツク吹咀淳苦酒三升煮得モ一升過寒溫

一服有膿血當吐之葛氏方同之

百濟新集方治肺癰方

黃耆一兩カハミツ以水三升煮取一升八二服葛氏方同之

僧深方治肺癰經時不差桔梗湯主之方

范汪方治肺癰方用

薏苡一升吹咀ハチクツク淳苦酒三升モ煮得一升ハチクツク適寒溫

一服有膿血當吐之

范汪方同之

百洛新集方治肺癰方

黃耆カハミコト一兩以水三升煮取一升八二服葛氏方同之

僧深方治肺腸癰經時不老桔梗湯主之方

桔梗三兩甘草オホホコ薏苡人敗オホホコ將シケラ于地黃朮各

二兩當歸一兩來根皮一升

凡八物切以水一斗五升煮大豆四升取七升汁去

豆豆內清酒三升合藥煮取三升半去滓服七

合日三夜再禁生菜

醫門方療肺癰喘氣急卧不得安者方

膏ハナタカ歷子三兩ハナタカ熬ハナタカ搏如泥大桑葚破水二升ハナタカ

煮桑二沸去滓內亭脂ハナタカ一兩煎取一升

又以布ハナタカ憑額ハナタカ服之忌猪肉ハナタカ酸醢ハナタカ

醫心方卷第十五

先康照見